



Prevnar20^{MC}

LA PREMIÈRE ANNÉE PEUT ÊTRE REMPLIE DE SURPRISES

Assurez-vous qu'il reçoive
les **3 doses de Prevnar 20**
prévues au calendrier de
vaccination systématique
avant son **1^{er} anniversaire**
afin de contribuer à sa
protection contre la PI.

Les nourrissons exposés
à un grand risque de
PI pourraient avoir
besoin de 4 doses de
Prevnar 20. Consultez
votre médecin pour
en savoir davantage.

Prevnar 20 est un vaccin antipneumococcique qui contribue à protéger le vacciné contre 20 types de la bactérie *Streptococcus pneumoniae*.

Prevnar 20 agit en aidant le corps à fabriquer ses propres anticorps contre ces bactéries. Il contribue à protéger les enfants de 6 semaines à 17 ans contre des maladies telles que la pneumonie bactériémique (infection des poumons et présence de bactéries dans le sang), la sepsie ou la bactériémie (présence de bactéries dans le sang) et la méningite (inflammation autour du cerveau).

PI : pneumonie invasive



QU'EST-CE QUI EXPOSE VOTRE BÉBÉ À UN PLUS GRAND RISQUE DE PI?



Son âge

Les bébés et les personnes âgées forment les groupes d'âge les plus touchés par la pneumonie invasive (PI) causée par la bactérie *Streptococcus pneumoniae*.

Son environnement

Les enfants de moins de 5 ans qui fréquentent un milieu éducatif sont exposés à un plus grand risque de PI, car ils sont plus enclins à échanger avec d'autres enfants des objets qu'ils mettent habituellement dans leur bouche, tels que des jouets.



POURQUOI LA PRÉVENTION DE LA PI EST-ELLE IMPORTANTE?

Pour en savoir plus, visitez le site Prevnar20Infant.ca/fr dès aujourd'hui.



Les bébés et les personnes âgées forment les groupes d'âge les plus touchés par la pneumonie invasive (PI), une infection grave causée par la bactérie *Streptococcus pneumoniae*.

La PI peut s'attaquer aux poumons, aux oreilles, aux sinus, au sang et au cerveau de votre bébé.



La bactérie *Streptococcus pneumoniae* est assez répandue et peut devenir résistante aux médicaments, ce qui rend l'infection plus difficile à traiter.

C'est pourquoi il est si important d'**empêcher l'apparition de la PI** au moyen d'un vaccin comme Prevnar 20 (qui est inutile pour traiter une infection déjà présente).

PI : pneumonie invasive



POURQUOI PREVNAR 20?



Prevnar 20 est un vaccin antipneumococcique utilisé pour prévenir des maladies comme la pneumonie bactériémique, la sepsie, la bactériémie et la méningite causées par **20 types** de la bactérie *Streptococcus pneumoniae*.

Lorsqu'il est administré conformément aux recommandations, ce vaccin peut :



- ★ aider le corps de votre bébé à fabriquer ses propres anticorps;
- ★ aider à protéger votre bébé contre les maladies causées par 20 types de la bactérie *Streptococcus pneumoniae*.

Les vaccins de la gamme Prevnar sont disponibles pour les bébés canadiens depuis plus de 22 ans.

- ★ **Prevnar** – depuis 2001
- ★ **Prevnar 13** – depuis 2009
- ★ **Prevnar 20** – depuis 2023



- ★ Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande le Pneu-C-20 (Prevnar 20) dans le cadre du programme d'immunisation systématique des nourrissons.
- ★ Ce vaccin contient **le plus grand nombre de souches** de pneumocoque parmi tous les vaccins antipneumococciques administrés systématiquement aux enfants (20 souches, comparativement à 15 souches dans le Pneu-C-15)*.

* La portée clinique comparative est inconnue.

Prevnar (vaccin antipneumococcique heptavalent conjugué) n'est plus offert au Canada.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT D'ADMINISTRER TOUTES LES DOSES DE PREVNAR 20?



Prevnar 20 doit être administré plus d'une fois pour que le système immunitaire de votre bébé puisse se développer avec le temps.

Il est important de suivre les directives de votre médecin ou de votre infirmière pour que **votre enfant reçoive toutes les doses nécessaires du vaccin.**

Calendrier de vaccination systématique pour les nourrissons en santé



À l'âge de 2 mois :
1^{RE} DOSE



À l'âge de 4 mois :
2^E DOSE



À l'âge de 11 à 12 mois :
3^E DOSE

Calendrier de vaccination systématique pour les nourrissons exposés à un grand risque de PI



Si votre enfant ne reçoit pas l'une des doses prévues, demandez à votre professionnel de la santé de vous indiquer ce qu'il faut faire pour protéger votre enfant¹.

RENSEIGNEMENTS SUR L'INNOCUITÉ DE PREVVAR 20

Prevvar 20 ne doit pas être administré si votre enfant est allergique (hypersensible) aux substances actives qu'il renferme, à tout autre ingrédient du vaccin ou à tout autre vaccin qui contient l'anatoxine diphtérique.

Faites particulièrement attention avec Prevvar 20 si :

- votre enfant a ou a eu des problèmes médicaux après avoir reçu une dose de Prevvar 20 ou de Prevvar 13, par exemple une réaction allergique ou des difficultés à respirer;
- votre enfant a une maladie sévère ou une forte fièvre; en revanche, en cas de légère fièvre ou de rhume, il n'y a pas lieu de reporter la vaccination;
- votre enfant a un trouble de la coagulation ou a facilement des ecchymoses (bleus);
- le système immunitaire de votre enfant est affaibli par une maladie ou par un médicament; il pourrait ne pas retirer tous les bienfaits possibles de Prevvar 20.

Prevvar 20 ne prévient que les maladies causées par les types de *Streptococcus pneumoniae* couverts par le vaccin. Comme tous les vaccins, Prevvar 20 ne protège pas toutes les personnes qui le reçoivent.

Après la vaccination par Prevvar 20, les enfants et adolescents peuvent présenter une perte d'appétit, de l'irritabilité, de la somnolence, de la fièvre, une rougeur, une enflure, une induration, une douleur ou une sensibilité au point d'injection, de la diarrhée, des vomissements et une éruption cutanée.

Vous avez d'autres questions? Visitez le site
Prevvar20Infant.ca/fr/!

